


Dansk Lungemedicinsk Selskab

Flowchart over astma diagnostik



Generelt: Diagnosen astma stilles ud fra en kombination af det kliniske billede (disposition, allergi, symptomer) og en positiv diagnostisk test. Ofte er flere diagnostiske tests nødvendige før diagnosen stilles. Vær kritisk overfor en positiv test hos en patient med atypiske symptomer.

* Måling af variabilitet af peakflow (PEF) kan vælges, såfremt der ikke er andre diagnostiske muligheder. "Daily diurnal PEF variability" beregnes som gennemsnittet af døgnvariation over minimum 7 dage: (dagens højeste - dagens laveste/ gennemsnittet af dagens højeste og laveste). En variation på over 10 % anses for signifikant. En tydelig tendens til en PEF-variation på over 20 % anses også som positivt resultat, se tekst i vejledningen.

#Evt. lavere dosis hos ældre/ved co-morbiditet

**Positiv test ved fald i FEV1 på: 15% ved mannitoltest og 20% ved metakolintest, 10% på 2 punkter ved EVH og anstrengelsestest.

Husk også:

- Allergiudredning med priktest eller specifik IgE for standardinhalationspanel
- Rygeanamnese
- Allergeneksposition

*** OBS, at der kan være behov for mere end én test, afhængigt af den kliniske problemstilling.