

Positivlisten omfatter lægemidler, der på regionens regning kan rekvireres af læger **til brug i almen praksis** i Region Sjælland ved akutbehandling (jf. Overenskomsten om almen praksis §36). Listen er gældende fra den 6. februar 2023.

Ifølge den gældende receptbekendtgørelse skal lægemidler til brug i praksis rekvireres elektronisk via FMK. **Apotekerne skal fakturere al rekvisition (inkl. gebyrer) ved anvendelse af regel 11. Faktura må ikke anvendes.**

**Apoteket må kun ekspedere lægemidler inden for den angivne ATC-kode på listen og skal substituere til de billigste synonyme eller parallelimporterede præparater, hvorfor "Ej S" ikke er mulig.** I særlige tilfælde kan praktiske forhold tages i betragtning såsom hensyn til blisterpakning, delekærv og udløb. **Vær opmærksom på begrænsninger i mulighederne for rekvisition inden for styrke og lægemiddelformulering samt typen af inhalationsdevice.**

Rekvisitionerne skal tilrettelægges således, at der ikke opbygges større lagre hos de praktiserende læger. Der bør som udgangspunkt kun rekvireres lægemidler **til højst 3 måneders forbrug**. Mængden af lægemidler, der udleveres til patienter, bør kun svare til patientens behov, indtil lægemidlet kan fremskaffes fra et apotek.

**Ved restordre** på angivne lægemidler **skal apotekerne kontakte regionen** med henblik på godkendelse af en rekvisition på et alternativt præparat, medmindre alternativet allerede fremgår af listen. Regionen vil løbende bestræbe sig på at tilføje en bemærkning om et godkendt alternativt præparat, der må rekvireres i tilfælde af restordre.

Listen er udarbejdet i samarbejde mellem PLO-Sjælland, Den regionale Lægemiddelkomité, praksiskonsulent under regional lægevagt, faglig programleder for regional lægevagt og Lægemiddelenheden.

Spørgsmål og ændringsforslag til Positivlisten kan rettes til:

Lægemiddelenheden, Region Sjælland på mail [imenheden@regionsjaelland.dk](mailto:imenheden@regionsjaelland.dk).

## MIDLER MOD INFEKTIONER – PENICILLINER:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
J01CE01	Benzylpenicillin	pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning <sup>#</sup>	0,6 g (1 mill. IE) 1,2 g (2 mill. IE) 3 g (5 mill. IE)	
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	tablet	400 mg (600.000 IE) 800 mg (1,2 mill. IE)	Fx Primcillin <i>Primcillin 400 mg kan deles mhp. på en halv dosis, fx til børn</i>
J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	tablet	990 mg (1,5 mill. IE)	Til erythema migrans (Borrelia burgdorferi)

<sup>#</sup> Intramuskulær (i.m.) indgift bør kun anvendes, hvis benzylpenicillin ikke kan gives intravenøst (i.v.), idet stoffet er stærkt lokalirriterende. Der bør anvendes opløsning tilsat lokalanalgetikum (lidokain) ved opblanding til i.m. indgift. Denne lidokainchlorid-opløsning må kun anvendes i.m. og ikke gives i.v., jf. instruktion på [www.pro.medicin.dk](http://www.pro.medicin.dk).

## MIDLER MOD INFEKTIONER – MAKROLIDER:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
J01FA09	Clarithromycin	tablet	500 mg	OBS. Ikke depottabletter
	Clarithromycin	granulat til oral suspension	25 mg/ml	<i>Ved restordre kan 50 mg/ml rekvireres</i>
J01FA06	Roxithromycin <sup>±</sup>	tablet	150 mg	OBS. Ikke 300 mg

<sup>±</sup> Roxithromycin bør kun anvendes til børn og voksne med en legemsvægt over 40 kg, såfremt clarithromycin ikke er egnet pga. risiko for interaktion mellem clarithromycin og andet lægemiddel, samt til patienter hvor de kardielle bivirkninger, der er forbundet med clarithromycin, udgør en risikofaktor for patienten.

**MIDLER MOD URINVEJSINFEKTIONER:**

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
J01CA08	Pivmecillinam	tablet	200 mg	
			400 mg	
J01XE01	Nitrofurantoin*	tablet	50 mg	
J01EA01	Trimethoprim	tablet	100 mg	

\*I restordre perioden må den magistrelt fremstillede Nitrofurantoin 50 mg tabletter 30 stk rekvireres.

**MIDLER MOD INFEKTIONER - PENICILLINER MED UDVIDET SPEKTRUM:**

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
J01CA04	Amoxicillin	tablet	750 mg	Til KOL-eksacerbationer (bakterielt betinget)
J01CA04	Amoxicillin	dispergibel tablet	500 mg	Kan deles for at lette indtagelsen
J01CF01	Dicloxacillin	kapsel	250 mg	
			500 mg	

**MIDLER MOD INFEKTIONER – CEFALOSPORIN:**

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
J01DD04	Ceftriaxon	pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning <sup>‡</sup>	1 g	10 stk. á 1 g i 10 ml hætteglas* Dosis er 2 g (2 hætteglas) til voksne  Kan rekvireres i styrken 2 g ved restordre på 1 g

<sup>‡</sup> Intramuskulær (i.m.) indgift bør kun anvendes, hvis ceftriaxon ikke kan gives intravenøst (i.v.), idet stoffet er stærkt lokalirriterende. Der bør anvendes opløsning tilsat lokalanalgetikum (lidokain) ved opblanding til i.m. indgift. Denne lidokainchlorid-opløsning må kun anvendes i.m. og ikke gives i.v., jf. instruktion på [www.pro.medicin.dk](http://www.pro.medicin.dk).

\* Ved første rekvirerende læge faktureres regionen for hele pakningen samt for delpakningsgebyr. Der udleveres 2 portioner (2 x 1 g) i hætteglas med en volumen på min. 10 ml. Ved rekvirering fra de efterfølgende læger faktureres regionen alene for delpakningsgebyr og lægerne får hver udleveret 2 portioner.

**ANTIVIRALE MIDLER:**

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
J05AB01	Aciclovir	tablet	400 mg	KUN til herpes zoster

**SMERTESTILLENDEN MIDLER – OPIOIDER:**

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
N02AA01	Morphin	injektionsvæske, opløsning	20 mg/ml	Ved restordre kan 10 mg/ml rekvireres
		tablet	10 mg	

**SMERTESTILLENDEN MIDLER – ANDRE:**

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
N02BE01	Paracetamol	tablet	500 mg	
		suppositorium	125 mg	
			250 mg	

M01AE01	Ibuprofen	tablet	400 mg	
M01AB05	Diclofenac	suppositorium	50 mg	
			100 mg	
M01AB15	Ketorolac	injektionsvæske, opløsning	30 mg/ml	<i>Fx Toradol</i>
N02CC01	Sumatriptan	tablet	50 mg	

#### ANTIEMETIKA:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
A03FA01	Metoclopramid	injektionsvæske, opløsning	5 mg/ml	Primperan®  <i>Max 10 mg x 3 dagligt i max 5 dage pga. risiko for neurologiske bivirkninger</i>
A03FA01	Metoclopramid	tablet	10 mg	. <i>Max 10 mg x 3 dagligt i max 5 dage pga. risiko for neurologiske bivirkninger</i>

#### ANTIPARKINSON MIDLER:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
N04AA02	Biperiden	injektionsvæske, opløsning	5 mg/ml	Akineton®

#### MIDLER MOD MAVESÅR:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
A02BC02	Pantoprazol	enterotablet	20 mg	<i>OBS. KUN styrken 20 mg må rekvireres</i>

#### ANTIALLERGIKA:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
H02AB04	Methylprednisolon-succinat	pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning	40 mg	<i>Solu-medrol</i>  <i>tørstof + solvens.</i>
H02AB04	Methylprednisolon-acetat	injektionsvæske, suspension	40 mg/ml	Depo-Medrol®  <i>OBS. KUN til lokale inflammatoriske tilstande og <u>ikke</u> til sæsonbetingede allergiske sygdomme</i>
C01CA24	Adrenalin	injektionsvæske, opløsning	1 mg/ml	<i>IKKE autoinjektor som EpiPen/Jext/Emerade</i>
R06AA04	Clemastin	injektionsvæske, opløsning	1 mg/ml	
R06AE07	Cetirizin	tablet	10 mg	

**HJERTEMEDICIN:**

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
C03CA01	Furosemid	injektions- og infusionsvæske, opl.	10 mg/ml	<i>tørstof + solvens.</i>
C03CA01		tablet	40 mg	
B01AC06	Acetylsalicylsyre	tablet	150 mg	<i>OBS. IKKE 75 mg 2 tabletter á 150 mg tygges v. AML-mistanke</i>
C01DA02	Glyceryltrinitrat	sublingual spray	0,4 mg/dosis	

**ASTMA-/KOL MIDLER**

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
H02AB06	Prednisolon	tablet	25 mg	
R03AC02	Salbutamol	inhalationsspray, suspension	0,1 mg/dosis	
R03CC02		injektionsvæske	0,5 mg/ml	
R03CC02		oral opløsning	0,4 mg/ml	

**PSYKOFARMAKA:**

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
N05BA04	Oxazepam	tablet	15 mg	
N05AH03	Olanzapin	pulver til injektionsvæske, opløsning	10 mg	Zyprexa®
N05AX08	Risperidon	tablet	0,5 mg	<i>Kun til kortvarig behandling af aggressive, fysisk voldelige, psykotiske eller særlig forpinte patienter med demens</i>
N05BA01	Diazepam	emulsion, injektionsvæske	5 mg/ml	Stesolid  <i>Grundet restordre kan IRS-præparatet Diazepam-Lipuro "B.Braun", 10 mg/2 ml ekspederes. Find information om den regionale udleveringstilladelse <a href="#">her</a>.</i>
N05BA01	Diazepam	rektalvæske, opløsning, enkelt dosisbeholder	5 mg/dosis	<i>Erstatter rektalvæske opløsning, 5 mg/ml som er udgået pr. 26-12-2022</i>
N05BA01	Diazepam	rektalvæske, opløsning, enkelt dosisbeholder	10 mg/dosis	
N05CD08	Midazolam	injektions- og infusionsvæske, opløsning	1 mg/ml	

**ØJENMIDLER:**

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
S01AA01	Chloramphenicol	øjendråber, opløsning	5 mg/ml	Enkelt dosis-beholdere, 30 x 0,25 ml (Kloramfenikol 'Santen')  <i>Ved restordre kan flerdosisbeholdere med chloramphenicol rekvireres</i>
S01BC03	Diclofenac	øjendråber, opløsning	1 mg/ml	Voltabak
S01HA02	Oxybuprocain	øjendråber	0,4%	20 endosisbeholder á 0,5 ml (magistrel).  <i>Opbevares lysbeskyttet.</i>  <i>Kræver udleveringstilladelse til IRS præparatet Oxybuprocain "Minims" 0,4 %, enkelt dosisbeholdere.</i>
S01JA01	Flourescein	øjendråber	2 %	Flourescein Minims (IRS) Enkelt dosisbeholder 20 x 0,5 ml <i>Kræver udleveringstilladelse</i>

**DIVERSE:**

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
A03BA01	Atropin	injektionsvæske, opløsning	1 mg/ml	
A03AB02	Glycopyrroniumbromid	injektionsvæske, opløsning	0,2 mg/ml	Fx Robinul
H04AA01	Glucagon	pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning	1 mg	GlucaGen Hypokit
N01BB02	Lidocain	injektionsvæske, opløsning	10 mg/ml	<i>Ved restordre kan anden styrke rekvireres</i>
N01BB52	Lidocain og adrenalin	injektionsvæske, opløsning	10 mg/ml og 5 µg/ml	Fx Xylocain-Adrenalin®. <i>Opbevares ved 2-15 °C. Efter åbning: 3 dage</i>  <i>Ved restordre rekvireres:</i> <i>-- Lidokain-adrenalin "SAD", injektionsvæske 10 mg/ml + 5 µg/ml fra sygehusapotek</i> <i>ELLER</i> <i>- Carbocain-Adrenalin® 10 mg/ml + 5 µg/ml</i>
V07AB	Natriumchlorid	solvens til parenteral anvendelse	9 mg/ml	<i>IKKE infusionsvæsker</i>
V07AB	Vand (sterilt)	solvens til parenteral anvendelse		Fx Sterilt Vand Mini-plasco®
A06AG11	Natriumcitrat og natriumlaurylsulfoacetat	rektalvæske, opløsning, endosisbeholder	9 mg/ml + 90 mg/ml	Microlax®
B02BA01	Phytomenadion	injektionsvæske, opløsning	10 mg/ml	Konaktion® Novum